

**Research Article**

# **The Causal Relationship of the Feature Personality Traits Following Mediation Therapy Perceived Social Support in Female Cancer Patients**

**Authors**

**Maryam Mardani<sup>1</sup>, Manijeh Firooz<sup>2\*</sup>, Tina Vosoughi<sup>3</sup>**

- 1- PhD Candidate in Health Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran  
2- Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran  
3- Hematologist and medical oncologist, Assistant Professor of Internal Medicine Department, Faculty of Medicine, Jundishapur University, Ahvaz, Iran

**Abstract**

**Receive Date:**  
00/00/0000

**Accept Date:**  
00/00/0000



**Introduction:** Adherence to treatment is an important issue in the field of physical and mental health that saves the lives of many people slowly. The present study aims to investigate the causal relationship of the characteristic Personality traits following treatment or mediation Social support was conducted in female cancer patients.

**Method:** The descriptive research method and correlational research design was a structural equation model (SEM). 310 women with cancer in the city of Ahvaz in the winter of 1402 in a sample way Available options were selected. Tools used in the questionnaire compliance with treatment (Sydfatemi et al., 2017), Neo's personality (Costa & McCrae, 1992) and perceived social support (Zimmet et al., 1988). for data analysis, SPSS software was used for descriptive information and AMOS software was used to evaluate the model. Direct relationships were calculated with Aimos software and indirect relationships were calculated with Bootstrap method of Aimos software and the index Absolute fit, relative or incremental fit, and limited or adjusted fit were reported.

**Results:** Analysis Structural equation modeling emphasized that the fit of the proposed model is good. Also, the results indicated that the feature Personalities and subscales His Highness (Ravanjoorkhui, Bron Orientation, openness to experience, agreeableness and duty science) through mediation Social support has an effect on treatment compliance.

**Discussion and Conclusion:** Considering the important issue of adherence to treatment, it seems important In order to improve this variable, related and influencing variables such as characteristics personality and social support, more attention from officials and politics Health and mental health providers should be placed.

**Keywords**

adherence to treatment, characteristic Personality traits, social support

**Corresponding Author's E-mail**

Manijeh Firooz  
[mfiroozy@ut.ac.ir](mailto:mfiroozy@ut.ac.ir)

# رابطه علّی ویژگی‌های شخصیتی با تبعیت از درمان با میانجی‌گری حمایت اجتماعی در کشده در بیماران زن مبتلا به سرطان

نویسنده‌گان

مریم مردانی<sup>۱</sup>، منیژه فیروزی<sup>۲\*</sup>، تینا وثوقی<sup>۳</sup>

- ۱- کارنده‌ای دکتری تخصصی روان‌شناسی سلامت، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، داشتگاه تهران، تهران، ایران  
۲- دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، داشتگاه تهران، تهران، ایران  
۳- فوق تخصص خون و سرطان بالا، استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی، داشتگاه جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

**مقدمه:** تبعیت از درمان، موضوعی مهم در حوزه سلامت جسم و روان است که جان افراد زیادی را حفظ می‌کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علّی ویژگی‌های شخصیتی با تبعیت از درمان یا میانجی‌گری حمایت اجتماعی در بیماران زن مبتلا به سرطان انجام شد.

**روش:** روش پژوهش توصیفی و طرح پژوهش همیستگی از نوع مدل معادلات ساختاری (SEM) بود. زن ۳۱۰ مبتلا به سرطان در شهر اهواز در زمستان ۱۴۰۲ به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسش‌نامه‌های تبعیت از درمان (سیدفاطمی و همکاران، ۱۳۹۷)، شخصیت نو (کاستا و مک‌کری، ۱۹۹۲) و حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت و همکاران، ۱۹۸۸) بود. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار اس‌بی‌اس‌اس (SPSS) جهت اطلاعات توصیفی و نرم افزار ایموس (AMOS) جهت ارزیابی مدل استفاده شد. روابط مستقیم با نرم افزار ایموس و روابط غیرمستقیم با روش بوت استراپ نرم افزار ایموس محاسبه شد و شاخص‌های برازش مطلق، برازش نسبی یا افزایشی و برازش ایجازی یا تعدیل یافته گزارش شد.

تاریخ دریافت:  
۰۰/۰۰/۰۰

تاریخ پذیرش:  
۰۰/۰۰/۰۰



**نتایج:** تحلیل‌های الگویابی معادلات ساختاری تأکید کرد که برازنده‌گی مدل پیشنهادی مناسب است. همچنین نتایج حاکی از آن بود که ویژگی‌های شخصیتی و خردمندی‌های آن (روان‌رنجورخوبی، بروونگرایی، گشودگی به تجربه، توافق‌پذیری و وظیفه‌شناسی) از طریق میانجی‌گری حمایت اجتماعی بر تبعیت از درمان تأثیرگذار بوده است.

**بحث و نتیجه‌گیری:** با توجه به بحث مهم تبعیت از درمان، به نظر مهم می‌رسد که در جهت ارتقای این متغیر، متغیرهای مرتبط و تأثیرگذار بر آن چون ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی، مورد توجه بیشتری از جانب مسئولین و سیاست‌گذاران بهداشت و سلامت روان قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها

تبعیت از درمان، ویژگی‌های شخصیتی، حمایت اجتماعی

پست الکترونیکی نویسنده مسئول

---

منیژه فیروزی  
[mfiroozy@ut.ac.ir](mailto:mfiroozy@ut.ac.ir)

زندانی‌گیرانش شله

## مقدمه

پستان مبتلا می‌شوند. طبق رصدخانه جهانی سرطان، شیوع سرطان پستان از دو میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ به بیش از سه میلیون نفر در سال ۲۰۴۶ خواهد رسید [۱۲]. مطالعات نشان می‌دهد تعداد ۱۶۹۶۷ مورد جدید سرطان پستان و ۴۸۱۰ مورد مرگ ناشی از آن در ایران در سال ۲۰۲۰ برآورد شده است. هم چنین در پژوهش انجام شده بر روی داده‌های ثبت سرطان ایران در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ پیش‌بینی شده است که تا سال ۲۰۲۵، میزان بروز سرطان پستان در زنان ۶۳٪ افزایش یابد و تعداد بیماران تشخیص داده شده در آن سال، به ۲۵۰۱۳ مورد برسد. بروز سرطان پستان از میزان ۱۵ درصد هزار نفر در مناطق شهری تا ۳۴/۶ در کلانشهرها متغیر است. همچنین این میزان از حدود ۱۸/۱، ۱۹/۱، ۱۹/۷ به ترتیب در غرب، شمال و شرق ایران تا حدود ۲۹/۳ و ۲۹/۷ در جنوب و مرکز متغیر است [۱۳]. از طرفی فرایند درمان در اختلال‌های ماندگار و مزمن استفاده طولانی‌مدت از داروها و درمان‌های مختلف را می‌طلبید. با این توصیف، فایده‌های درمان دارویی و غیرمحقق نمی‌شود، چون ۵۰ درصد از بیماران داروها را طبق دستور تجویزشده به کار نمی‌برند یا توصیه پزشکان را به‌طور کلی اجراء نمی‌کنند [۱۴]. تبعیت از درمان میزان تطبیق رفتارهای بهداشتی بیمار می‌شود که استفاده دارو، رژیمهای غذایی و یا انجام تغییرات در روش و سبک زندگی مطابق با دستورات و تجویزات پزشکان و متخصصین سلامت و مراقبت‌های بهداشتی است ر شامل می‌شود [۱۵]. پایین بودن تبعیت از درمان یک علت عدمه برای کاهش در نتایج بهینه مراقبت‌های بهداشتی است [۱۶]. سازمان جهانی بهداشت واژه تبعیت از درمان را میزان پیروی از توصیه‌های پزشکی و غیردارویی نیز در نظر می‌گیرد. برای بیماری‌های مزمن مداخله‌های غیردارویی زیادی وجود دارد که انجام دادن آن برای کنترل و پیشرفت بیماری‌ها مهم است؛ رفتارهایی چون رژیم غذایی سالم، برنامه‌های ورزشی و محدود کردن مصرف سیگار و الکل، نمونه‌هایی از این رفتارها هستند [۱۷ و ۱۸]. تبعیت از درمان یک رفتار سلامت‌مدار دشوار و پیچیده است و تعداد زیادی از مطالعات به پیش‌بینی و بررسی علت‌های اثرگذار بر آن اختصاص یافته است [۱۹، ۲۰، ۲۱].

پیروی از درمان<sup>۲</sup> موضوعی مهم در حوزه سلامت است که جان افراد زیادی را حفظ می‌کند [۲۲، ۲۳، ۲۴]. این اصطلاح

سرطان یکی از مشکلات بزرگ بهداشت عمومی در تمام جهان و عامل دوم مرگ‌ومیر پس از بیماری قلبی و عروقی است و تا سال ۲۰۶۰ به علت اصلی مرگ‌ومیر تبدیل خواهد شد [۱]. سرطان به عنوان یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن دارای ویژگی‌های عوارض بالا، مرگ‌ومیر بالا و عود زیاد است؛ اگرچه خوشبختانه میزان بقاء و زمان بقای بیماران مبتلا به سرطان به دلیل افزایش آگاهی بهداشت عمومی، تشخیص زودهنگام و پیشرفت در فناوری پزشکی به‌طور قابل توجهی بهبود یافته است [۲]. ابتلا به سرطان چالش‌های زیادی را در بیماران به وجود می‌آورد که می‌توان به این موارد اشاره کرد: سازگاری با خبردار شدن ابتلا به بیماری، تعییر در اندام بدن با جراحی، ریزش مو، سوختگی‌های ناشی از پرتودرمانی، برنامه‌ریزی و بهمودی پس از درمان‌های جراحی، رویه‌رو شدن با عوارض جانبی درمان، رهایی از بیماری، عود و یا پیشرفت آن و انتظار مرگ در موارد پیش‌رونده بیماری [۳]. تشخیص سرطان<sup>۱</sup> بیش از هر بیماری دیگری تجربه‌ای ناگوار، ناراحت-کننده و غیرقابل باور برای هر انسانی است. بیماری سرطان پس از بیماری قلبی عروقی عامل دوم مرگ‌ومیر در کل جهان است. تعداد زیادی از افراد بعد از ابتلا به سرطان احساساتی چون غم، ترس، اضطراب را دارند [۴، ۵، ۶، ۷]. همچنین این بیماری در سال ۲۰۲۰ در ایران ۱۳۱۱۹۱ نفر را درگیر کرده و منجر به فوت ۷۹۱۳۶ نفر از مبتلایان شده است [۸]. هر سال تعداد زیادی از این بیماران را با شرایط دشوار بیماری مواجه می‌کند، شرایطی که بر کیفیت زندگی افراد مبتلا بر جا می‌گذارد [۹]. میزان بروز ابتلای سالیانه به بیماری سرطان در دنیا از ۱۴ میلیون نفر در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۲۵ میلیون نفر در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید که بیشتر از ۱۷۰ درصد آن در کشورهای در حال توسعه اتفاق می‌افتد [۱۰]. تعداد ابتلا به بیماری سرطان در سال‌های گذشته و تأثیر آن بر تمامی بعدهای سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی زندگی انسان‌ها باعث شده است که سرطان به عنوان مشکل عدمه بهداشت قرن شناخته شود [۱۱]. یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در میان زنان سرطان پستان می‌باشد، به‌نحوی که طبق آمارهای سازمان جهانی بهداشت، سرطان پستان حدود ۳۰ درصد سرطان‌های زنان را شامل می‌شود. بیش از دو میلیون زن سالانه به سرطان

خاص [۳۶]. شخصیت<sup>۱۱</sup> به سبک‌های نسبتاً پایدار مربوط به تفکر<sup>۱۲</sup> احساس<sup>۱۳</sup> و عمل<sup>۱۴</sup> اشاره دارد و به سلامت از طریق شکل دادن به روش‌های ارزیابی رویدادها، چالش‌ها و احساسات بدن مربوط می‌شود [۳۷، ۳۸، ۳۹]. نتایج پژوهش‌ها از همبستگی مثبت بین نمرات شخصیت روان‌رنجور و افسردگی، اضطراب و نالمیدی حمایت می‌کند و ویژگی‌های شخصیتی نقش غیرقابل انکاری در سلامت بیماران سرطان بازی می‌کنند [۴۰]. حمایت اجتماعی<sup>۱۵</sup> نیز بر درمان و کنترل بیماری‌های مزمن مؤثر است. گرایش افراد به انجام فعالیت‌های خودمراقبتی از طریق تابآوری بر تبعیت از درمان اثر دارد [۴۱]. حمایت اجتماعی ادراک فرد از علاقه، مراقبت و بالرژش بودن برای دیگران تعریف می‌شود [۴۲، ۴۳]. بنابراین حمایت اجتماعی درکشده و تبعیت از محدودیت رژیم غذایی، تبعیت از محدودیت مصرف مایعات و تبعیت از دستورات دارویی و به طور کلی تبعیت از درمان رابطه معناداری وجود دارد و به عنوان عامل مهم در تبعیت از درما در نظر گرفته می‌شود [۴۴]. حمایت اجتماعی یک عامل مهم برای پیامدهای بهداشتی است که با خودکارآمدی و تبعیت از درمان ارتباط دارد [۴۵]. حمایت اجتماعی شبکه‌ی متشکل از خانواده، دوستان، همسایگان و جامعه که در موقع نیاز برای کمک روانی، جسمی و مالی در دسترس فرد مبتلا به سرطان است [۴۶]. حمایت اجتماعی به تحقق نیازهای اجتماعی افراد کمک می‌کند، عزت نفس را پرورش می‌دهد و حمایت معنوی را برای فرد فراهم می‌کند. فقر حمایت اجتماعی با افزایش‌های مرگومیر و پریشانی روان‌شناختی رابطه دارد و سلامت روانی و بهزیستی را کاهش می‌دهد [۴۷]. افزایش حمایت اجتماعی تأثیری مستقیم بر خودکارآمدی گذاشته و کیفیت زندگی فرد مبتلا به سرطان را افزایش می‌دهد [۴۸]. پژوهش‌ها از ارتباطات عامل‌های بیان شده را سنجیده‌اند. حمایت اجتماعی با تبعیت درمان ارتباط دارد [۴۹، ۴۵].

ضرورت پژوهش حاضر از آن حیث بود که تبعیت از درمان به دلیل شیوع زیاد این بیماری و پیامدهای ذکر شده در ایران و به خصوص جامعه بیماران مبتلا به سرطان که به واسطه این بیماری الزامات اجرایی سخت پروتکل‌های


مهم در تاریخ روان‌شناسی سلامت به درجه موفقیت بیمار در اجرای توصیه‌های درمانی و پیشگیرانه که از سوی متخصصان سلامت ارائه می‌شود، اشاره دارد [۲۵]. سازمان جهانی بهداشت پیروی از درمان را پایبندی به رفتارهای توصیه‌شده توسط متخصصان سلامت تعریف می‌کند که این پایبندی ترکیبی از درمان مناسب (صرف‌دار و مطابق با میزان لازم و برنامه تجویزشده) و مداومت (صرف‌دار و از شروع درمان تا انتهای درمان را شامل می‌شود) [۲۶]. تبعیت درمانی ضعیف موجب کمبود اثربخشی در درمان بیماری‌های مزمن می‌شود [۲۷، ۲۸، ۲۹]. همکاری با درمان بهخصوص برای بیماری‌های مزمن<sup>۱</sup> بسیار حائز اهمیت است و بیمار برای کنترل بیماری و جلوگیری از پیشرفت آن باید همکاری مناسبی داشته باشد. بیماری‌های مزمن سیر پیش‌رونده دارند و همکاری ضعیف باعث پیش‌روی بیماری، کاهش کیفیت زندگی و در نهایت شکست درمان می‌شود [۳۰]. از آنجاکه افراد مبتلا به بیماری مزمن مانند سرطان و بیماری قلبی به علت سختی‌های مربوط به بیماری و از دست دادن امید به ادامه زندگی به انواع مشکلات روان‌شناختی مبتلا می‌شوند، بروز این اختلالات نیز موجب پیروی نکردن از درمان می‌شود [۳۱]. تبعیت و همکاری بیمار تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند ویژگی‌های شخصیت<sup>۲</sup> شامل برون‌گرایی<sup>۳</sup>، وظیفه‌شناسی<sup>۴</sup> و گشودگی<sup>۵</sup> است [۳۲]. استرس<sup>۶</sup>، اضطراب<sup>۷</sup>، افسردگی<sup>۸</sup>، ادراک درد<sup>۹</sup>، متغیرهای تهدیدآمیز ادراک‌شده و بدتنظیمی هیجانی<sup>۱۰</sup> با پیروی و تبعیت از درمان رابطه دارند [۳۳]. از آنجاکه تمامی عوامل ذکر شده ناشی از صفات شخصیتی است، می‌توان گفت صفات شخصیت بر تبعیت از درمان اثر دارد [۳۴، ۳۵]. ویژگی‌های شخصیتی یکی از متغیرهای مهم در زندگی بیماران مبتلا به سرطان می‌باشد که ظرفیت آن‌ها برای انطباق و عدم انطباق با شرایط بیماری را مشخص می‌کند [۳۵]. عوامل شخصیتی می‌تواند به پاسخ درمان و تبعیت درمان تأثیر بگذارد بهویژه هنگام آماده‌سازی یک برنامه درمانی برای بیماران مزمن و

- 
1. chronic disease
  2. character traits
  3. extraversion
  4. conscientiousness
  5. openness
  6. stress
  7. anxiety
  8. depression
  9. perception of pain
  10. emotional dysregulation

11. personality  
12. thinking  
13. feeling  
14. acting  
15. social support

میانجی‌گری حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان ضرورت دارد، بنابراین هدف پژوهش حاضر، مدل‌بایی معادلات ساختاری تبعیت از درمان براساس ویژگی‌های شخصی و حمایت اجتماعی در بیماران زن مبتلا به سرطان پستان بود. شکل ۱ الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر را نشان می‌دهد.

درمانی را بر عهده دارند، اهمیت دارد. بهمنظور افزایش تبعیت از درمان به بررسی مدل‌های تبعیت از درمان نیاز است. از آنجاکه عامل مهم‌تر تبعیت از درمان، عوامل روحی، روانی، کمبود آگاهی و نگرش بیماران مبتلا به سرطان و کمبود حمایت اجتماعی است و با توجه به مؤلفه‌های زیادی که در تبعیت از درمان نقش دارند، مدل‌بایی ساختاری و تبعیت از درمان براساس ویژگی‌های شخصی با



شکل ۱. الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر

شرکت‌کنندگان انتخاب شدند [۵۰]. تعداد ۲۰ پرسشنامه نیز جهت ریزش به تعداد نمونه‌ها اضافه شد. ملاک ورود به پژوهش تمامی بیماران زن و مرد مبتلا به انواع سرطان از سن ۱۸ سال به بالا خواهد بود که یا در انجام درمان فعال هستند و یا دوره درمان خود را طی کردند و در مرحله فالوآپ ۳ ماهه (رونده درمان پیشکی) خود هستند. بیماران مبتلا به تمامی سرطان‌ها و تمامی استیج‌های درمانی را شامل می‌شود. بیماران مشکل روان‌شناختی پیچیده نباید داشته باشند و بیماری هم‌زمان جسمی نداشته باشند. بیماران باید سواد خواندن و نوشتن داشته و از نظر هوشیاری سالم باشند. شخص بیمار نسبت به پر کردن پرسشنامه اقدام کند. ملاک خروج شامل اعلام انصراف از شرکت در پژوهش و سوءصرف دارو را شامل می‌شود. شرط اساسی ورود به پژوهش حاضر رضایت کامل و آگاهانه و اطمینان دادن در مورد رازداری و حفظ اسرار شرکت-کنندگان خواهد بود. افراد در هر مرحله‌ای از پژوهش و پر کردن پرسشنامه‌ها امکان خروج را خواهند داشت. در هیچ‌یک از مراحل انجام نام افراد شرکت‌کننده درج نخواهد

## روش نوع پژوهش

روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش، همبستگی از نوع الگویابی معادلات ساختاری بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان استان خوزستان بود که در بازه زمانی زمستان ۱۴۰۲ برای پیگیری درمان به بخش آنکولوژی بیمارستان گلستان شهر اهواز مراجعه کردند. تعداد پارامترها در مدل با توجه به ویژگی‌های خاص آن باید شمارش شود. تعداد پارامترهای محاسبه شده این مدل بدین قرار محاسبه شد.

تعداد واریانس خطای درون‌زاد + تعداد کواریانس + تعداد

واریانس‌های متغیر برون‌زاد+مسیر

$$11+6+1=31$$

با توجه به پیشنهاد کلاین که می‌گوید به ازای هر پارامتر محاسبه شده دست‌کم نیاز به ۱۰ آزمودنی وجود دارد، تعداد نمونه ۳۱۰ نفر بود. روش نمونه‌گیری به صورت هدفمند با توجه به محدودیت ارتباط بیماران مبتلا به سرطان و شرایط خاص بودن آنان انجام شد و

که توسط کاستا و مک‌کری شناخته شده است [۵۳] که شامل ۶۰ آیتم است که هر ۱۲ آیتم یکی از ۵ عامل برون‌گرایی، توافق‌پذیری، وجودان، روان‌نوجوری و گشودگی به تجربه را می‌سنجد و هر آیتم روی یک مقیاس لیکرت ۱ تا ۵ اندازه‌گیری می‌شود. فرم کوتاه با فرم بلند همبستگی ۰/۶۸ دارد و پایایی درونی خوبی نشان داده است. در تحقیقی آلفای کرونباخ برای هر کدام از عوامل روان‌نوجوری، برون‌گرایی، گشودگی به تجربه، وظیفه‌شناسی و توافق‌پذیری به ترتیب عبارت بودند از ۰/۸۲، ۰/۸۱، ۰/۷۶، ۰/۷۱ و ۰/۸۱ که مقادیر خوبی برای پایایی است [۵۳]. در پژوهش دیگر، اعتبار خردۀ مقیاس‌های این پرسشنامه به استفاده از روش بازآزمایی بین ۰/۷۵ تا ۰/۸۳ به دست آمده است [۵۴]. در ایران این پرسشنامه توسط نیکوگفتار و جزایری [۵۵] هنجاریابی شد. در پژوهش احمدی و همکاران [۵۶] ضریب همسانی درونی خردۀ مقیاس‌های پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ بین٪۰/۶۵ تا٪۰/۸۶ به دست آمد. اعتبار این پرسشنامه با استفاده از روش آزمون، آزمون مجدد به ترتیب ۰/۶۴، ۰/۷۰، ۰/۶۹، ۰/۷۵ و ۰/۵۹ برای عوامل روان‌نوجوری، برون‌گرایی، گشودگی توافق‌پذیری و وظیفه‌شناسی به دست آمد. در این پژوهش، ضریب همسانی درونی خردۀ مقیاس‌های این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ بین ۰/۷۶ تا ۰/۸۱ به دست آمد.

**مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده<sup>۲</sup> (MSPSS):** مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده یک ابزار ۱۲ ماده‌ای است و حمایت اجتماعی را از سه منبع خانواده، اجتماع و دوستان در اندازه‌های هفت درجه‌ای از ۱ (کاملاً مخالف) تا ۷ (کاملاً موافق) می‌سنجد [۵۷]. حداقل و حداکثر نمره فرد در کل مقیاس به ترتیب ۱۲ و ۸۴ در هریک از زیرمقیاس‌های حمایت خانوادگی، اجتماعی و دوستان به ترتیب ۴ و ۳۸ محاسبه می‌شود. نمره بالاتر نشان‌دهنده حمایت اجتماعی ادراک شده بیشتر است. ویژگی‌های روان‌سنجدی مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده در پژوهش‌های خارجی تأیید شده است [۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۵۷]. در بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجدی این ۳۱۱ (دانشجو) و ۴۳۱ (عمومی)، ضرایب آلفای کرونباخ برای  $n$  مقیاس در نمونه‌هایی از دانشجویان و جمعیت عمومی ایرانی (۷۴۲) کل مقیاس و ماده‌های سه زیرمقیاس حمایت اجتماعی خانوادگی، اجتماعی

شد. هر شرکت‌کننده در هر پرسشنامه یک کد اختصاصی را خواهند داشت.

### ابزارهای پژوهش

پرسشنامه تعیيت از درمان: پرسشنامه تعیيت از درمان در بیماران با بیماری مزمن در سال ۱۳۹۷ برای بیماران مزمن در ایران طراحی و روان‌سنجدی شده است. پرسشنامه شامل ۴۰ عبارت ۵ درجه لیکرت است. در بعد اهتمام درمان ۹ (سؤال)، تمایل به مشارکت در درمان (۷ سوال)، توانایی تطابق (۷ سوال)، تلفیق درمان با زندگی (۵ سوال)، چسبیدن به درمان (۴ سوال)، تعهد به درمان (۵ سوال) و تردید در اجرای درمان (۳ سوال) می‌باشد. این پرسشنامه بر درجه‌بندی پنج‌گانه لیکرت صورت‌بندی شده است. برای محاسبه نمره هر زیرمقیاس، نمره تک‌تک گویه‌های مربوط به آن زیرمقیاس با هم جمع می‌شود. برای محاسبه نمره پرسشنامه نمره همه گویه‌های مربوط به آن با هم جمع خواهد شد. حداقل و حداکثر نمره در حیطه‌های اهتمام در درمان ۰-۴۵، تمایل به مشارکت در درمان ۰-۳۵، توانایی تطابق ۰-۳۵، تلفیق درمان با زندگی ۰-۲۵، چسبیدن به درمان ۰-۲۵، تعهد به درمان ۰-۲۵ و تدبیر در اجرای درمان ۰-۱۵ است که براساس دستورالعمل طراحی پرسشنامه، نمرات اولیه تبدیل به نمره بین ۰-۱۰۰ می‌شود. براساس این پرسشنامه کسب نمره ۷۵-۱۰۰ به معنای تعیيت از درمان بسیار خوب، نمره ۵۰-۷۴ به معنای تعیيت از درمان متوسط و کسب نمره ۰-۲۵ به معنای تعیيت از درمان ضعیف درنظر گرفته شده است. جهت تعیین روایی صوری کیفی، گویه‌های پرسشنامه توسط ۱۱ نفر از افراد متخصص که دارای دانش و تجربه کافی در حیطه درمان و مراقبت افراد بزرگسال مبتلا به بیماری مزمن و ابزارسازی بودند، بررسی و تأیید شد. پایایی آزمون با روش آزمون مجدد و از طریق همسانی درونی و آلفای کرونباخ با اجرا در نمونه‌های شامل ۱۲۱ فرد بزرگسال مبتلا به بیماری مزمن، ۱۹۲۲ محسوبه و تأیید شد [۵۱]. در پژوهش رامک و همکاران [۵۲] پایایی این پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ برابر با ۰/۸۷ به دست آمد.

پرسشنامه شخصیت نئو NEO-FFI: این پرسشنامه فرم کوتاه NEO PI-R به نام پرسشنامه پنج عاملی نئو می‌باشد

به زیرمقیاس خانوادگی، ماده‌های ۱۲، ۹، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳ مربوط به زیرمقیاس دوستان است. برای ارزیابی مدل پیشنهادی از الگویی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS انجام شد.

#### یافته‌ها

نتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول ۱ نشان داده شده است.

و دوستان بهترتبیب ۰/۹۱، ۰/۸۷، ۰/۸۳ و ۰/۸۹ محسوبه شد و ضرایب همسانی درونی مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده را تأیید کرد [۶۲]. نمره هر زیرمقیاس برحسب مجموع ارزش گزینه‌های هر ماده (کاملاً مخالفم=۱؛ مخالفم=۲؛ تقریباً مخالفم=۳؛ نه مخالفم/نه موافقم=۴؛ تقریباً موافقم=۵؛ موافقم=۶؛ کاملاً موافقم=۷) محسوبه می‌شود. از جمع نمره تعداد کل ماده‌ها (۱۲ ماده) نیز نمره کل حمایت اجتماعی ادراک شده به دست می‌آید. ماده‌های ۱، ۲، ۵، ۱۰ مربوط به زیرمقیاس اجتماعی (افراد مهم)، ماده‌های ۳، ۴، ۸، ۱۱ مربوط

جدول ۱. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش

متغیرها	روان‌رنجورخوبی	برون‌گرایی	برون‌گرایی	گشودگی به تجربه	توافق‌پذیری	وظیفه‌شناسی	حمایت اجتماعی	تبعیت از درمان
روان‌رنجورخوبی	۱							
برون‌گرایی	-۰/۵۳**	۱						
گشودگی به تجربه	-۰/۲۹**	-۰/۲۲**	۱					
توافق‌پذیری	-۰/۳۳**	-۰/۳۲**	-۰/۲۶**	۱				
وظیفه‌شناسی	-۰/۵۳**	-۰/۵۱**	-۰/۲۲**	-۰/۲۷**	۱			
حمایت اجتماعی	-۰/۵۷**	-۰/۶۱**	-۰/۲۷**	-۰/۵۱**	-۰/۲۷**	۱		
تبعیت از درمان	-۰/۴۵**	-۰/۴۱**	-۰/۲۲**	-۰/۵۱**	-۰/۴۹**	-۰/۵۷**	۱	

جدول ۲. شاخص‌های برازش مدل

Chi square	P value	RMSEA	GFI	AGFI	CFI	NFI
۰/۱۳	۰/۰۰۰	۰/۰۰۷	۰/۹۳۷	۰/۹۲۴	۰/۹۹۶	۰/۹۹۳

تمامی شاخص‌های برازنده‌گی دارای برازش خوبی است. داده‌ها از الگوی مورد نظر پشتیبانی می‌کند.

براساس یافته‌های جدول ۱، همبستگی بین متغیرهای پژوهش از نظر آماری معنی‌دار بود. با توجه به یافته‌های جدول ۲، مدل پیشنهادی در

جدول ۳. نتایج مدل‌سازی ساختاری مدل پژوهش

مسیرهای مدل نهایی	اثرات مستقیم	سطح معنی‌داری
روان‌رنجوری ← تبعیت از درمان	-۰/۵۱	۰/۰۰۱
برون‌گرایی ← تبعیت از درمان	۰/۱۸	۰/۰۰۱
گشودگی به تجربه ← تبعیت از درمان	۰/۴۷	۰/۰۰۱
توافق‌پذیری ← تبعیت از درمان	۰/۲۱	۰/۰۰۱
وظیفه‌شناسی ← تبعیت از درمان	۰/۶۱	۰/۰۰۱
حمایت اجتماعی ← تبعیت از درمان	۰/۴۱	۰/۰۰۱
روان‌رنجوری ← حمایت اجتماعی	-۰/۳۲	۰/۰۰۱
برون‌گرایی ← حمایت اجتماعی	۰/۱۹	۰/۰۰۱
گشودگی به تجربه ← حمایت اجتماعی	۰/۳۵	۰/۰۰۱
توافق‌پذیری ← حمایت اجتماعی	۰/۱۷	۰/۰۰۱
وظیفه‌شناسی ← حمایت اجتماعی	۰/۵۲	۰/۰۰۱

خرده مقیاس‌های آن و ویژگی‌های شخصیتی و خرده مقیاس‌های آن به حمایت اجتماعی معنادار بود.


همان‌گونه که در جدول ۳ بیان شد، ضریب استاندارد مسیرها از متغیر ویژگی‌های شخصیتی به تبعیت از درمان،

جدول ۴. نتایج بوت استراپ برای اثرات غیرمستقیم ویژگی‌های شخصیتی و خرده مقیاس‌های آن با تبعیت از درمان از راه حمایت اجتماعی درک شده

سطح معنی‌داری	حد بالا	حد پایین	مقدار	مسیرهای غیرمستقیم
.0001	-0.72	-0.39	-0.65	روان‌رنجوری ← حمایت اجتماعی ← تبعیت از درمان
.0001	0.38	0.23	0.31	برون‌گرایی ← حمایت اجتماعی ← تبعیت از درمان
.0001	0.59	0.46	0.53	گشودگی به تجربه ← حمایت اجتماعی ← تبعیت از درمان
.0001	0.26	0.14	0.22	توافق‌بذری ← حمایت اجتماعی ← تبعیت از درمان
.0001	0.71	0.37	0.65	وظیفه‌شناسی ← حمایت اجتماعی ← تبعیت از درمان

استراپ، صفر را در بر نمی‌گیرند، بنابراین تمامی مسیرهای غیرمستقیم بین متغیرها معنی‌دار می‌باشند ( $p=0.001$ ).

با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ۴، حدود بالا و پایین تمامی روابط غیرمستقیم با استفاده از روش بوت



شکل ۲. نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری برای ضرایب مسیرهای مستقیم مدل پژوهش

درمان در بیماران مبتلا به سرطان و بحث متاستاز در آنان، گاه‌آنجام برخی از فعالیت‌های تبعیت از درمان نمی‌تواند به اندازه کافی مؤثر باشد و نتایج دلخواه درمانی را به بار آورد. بنابراین قسمتی از درمان مؤثر این بیماران تمرکز بر افزایش توانایی تبعیت از درمان است. آموزش بیماران مبتلا درباره اهمیت این موضوع می‌تواند در افزایش کارایی این فرآیند نقش بسزایی داشته باشد. با توجه به پژوهش حاضر و مطالعات همسو، مداخلات روان‌شناختی به‌ویژه درباره بیماران با توانایی کم تبعیت از درمان برای روشن شدن علت‌های روان‌شناختی تبعیت نکردن و انجام مداخلات لازم برای رفع آن باید در درمان بیماران مبتلا به سرطان جدی‌تر

## بحث و نتیجه‌گیری

هدف پژوهش حاضر مدل‌یابی معادلات ساختاری تبعیت از درمان براساس ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی در بیماران زن مبتلا به سرطان بود. نتایج تحقیق مشخص کرد که در بیماران مبتلا به سرطان متغیر روان‌رنجورخوبی شخصیتی به صورت منفی و متغیرهای گشودگی به تجربه و وظیفه‌شناسی به صورت مثبت و معنادار، تبعیت از درمان را پیش‌بینی می‌کنند. نتایج این پژوهش با مطالعه کوزاک و همکاران [۲۳]، هدایتی و همکاران [۲۸] و خیرآبادی و همکاران [۲۹] مبنی بر رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و پایبندی به درمان همسو است. با توجه به ماهیت فرایند

می‌کنند. آن‌ها به هدف‌های خود پایبند هستند و در امور زندگی و تبعیت از درمان نیز این پایبندی را دارند [۳۳، ۳۵]. در افرادی که ویژگی برون‌گرایی شخصیت دارند، فعالیت عقلانی، فکر کردن مثبت و جانشین‌سازی همراه می‌گردد. به‌نظر می‌رسد افرادی که بعد برون‌گرایی در آنان بُلد است، جهت‌گیری بین‌فردی بیشتری دارند و از حمایت اجتماعی به‌عنوان پاسخ به مشکلات استفاده می‌کنند. آن‌ها تلاش می‌کنند زندگی خود را به‌سمت بهینه پیش ببرند و در پی آن سبب افزایش جلب اعتماد و تبعیت از درمان می‌شوند [۲۸، ۲۹، ۳۳]. به‌طور معمول صفات منفی چون روان‌رنجوری، باعث به‌وجود آمدن عوامل استرس‌زا در ارتباطات هستند [۴۹]. این افراد از مقابله کردن با قطع دیگری رفتاری<sup>۲۰</sup> به‌وسیله ترک کردن دستیابی به هدف‌هایشان استفاده می‌کنند. آنان از مقابله با قطع درگیری ذهنی<sup>۲۱</sup> مثل خیال‌پردازی و درگیری با فعالیت‌ها برای فراموشی مشکلاتشان، حست‌وجویی حمایت اجتماعی به‌وسیله ابراز احساساتشان آشکارانه استفاده می‌کنند [۳۴]. به‌طور کلی روان‌رنجورخوبی با سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد مانند خصومت، واکنش خیال‌پردازی، سرزنش خود، تسکین، گوشش‌گیری، تفکر آرزومندانه، انفعال و تردید ارتباط دارد [۵۳] و تمامی این عوامل منجر به تبعیت درمان ضعیف می‌گردد. در بیماری‌های مزمن همچون سرطان تبعیت از درمان ضعیف است. حدود ۵۰٪ از همه بیماران مزمن تبعیت از درمان و دارو را طبق نظر متخصصین مصرف نمی‌کنند. پیامدهای عدم تبعیت از درمان گسترش‌تر است، از جمله اثربخشی درمان به‌خطر می‌افتد و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی را در پی دارد [۶۴، ۶۵]. در مجموع با توجه به نتایج حاصل از تحلیل مدل و همبستگی بین متغیرهای پژوهش می‌توان گفت که ویژگی‌های شخصیتی رشدیافته و نیز حمایت اجتماعی درک شده مثبت در تبعیت از درمان و در ادامه آن بهبودی حال بیماران مبتلا به سرطان مؤثر هستند. در نتیجه بر مبنای یافته‌ها می‌توان بسته‌های مداخله‌ای را با تکیه بر سازه‌های بنیادی مانند ویژگی‌های شخصیتی، با هدف کاهش مشکلات بیماران مبتلا به سرطان طراحی و کفایت بالینی آنان را

بررسی شود [۲۷]. مداخله‌های درمانی مرتبط با ویژگی‌های شخصیتی می‌تواند طولانی‌مدت و پیچیده باشد. چون روان-درمانی اختلالات شخصیت زمان‌بر می‌باشد و از توان این بیماران خارج می‌تواند باشد، با افزایش روان‌رنجورخوبی، تبعیت از درمان کاهش می‌یابد [۲۳]. در برنامه‌های بهداشتی و مراقبتی به ابعاد شخصیتی بیماران مبتلا به سرطان از جمله روان‌رنجورخوبی، گشودگی به تجربه و وظیفه‌شناسی توجه بیشتری باید بشود. افرادی که بعد وظیفه‌شناسی در آنان قوی بوده، دارای تلاش، نظم و مسئولیت بیشتری هستند و مسلماً با پشتکار و مسئولیت بیشتر درمان خود را تبعیت می‌کنند و به بهبودی نزدیک‌تر می‌شوند [۲۸، ۳۳]. در افراد روان‌رنجور اما، اضطراب و نگرانی زیادی که این بیماران دارند به‌واسطه مشکلات به‌وجود آمده در اثر ابتلای به بیماری و محدودیت‌های ناشی از آن باعث می‌شود توجه و تمرکز آن‌ها برای تبعیت از درمان و توصیه‌های متخصصین بهداشت و مراقبت کاهش یابد [۹]. حمایت اجتماعی درک شده نیز به‌عنوان میانجی پژوهش در ارتباط بین عامل روان‌رنجوری شخصیت و تبعیت درمان به‌صورت منفی و معنadar مؤثر بوده است و در ارتباط بین گشودگی به تجربه و توافق‌بذری و برون‌گرایی و وظیفه‌شناسی با تبعیت از درمان به‌صورت مثبت و معنadar میانجی‌گری می‌کند. این نتایج با پژوهش هدایتی و همکاران [۲۸] و گرکو و همکاران [۲۴] همسو می‌باشد. طبق نظریه اکلولوژی اجتماعی، علاوه بر شخص، مراقبان بهداشتی و خانواده و دوستان، رسانه و سازمان‌ها، سیستم‌های ارائه‌دهنده سلامت در بیماران هستند و حمایت اجتماعی مفهومی است که در اشکال متفاوت حمایت عاطفی چون بیان احساسات و پذیرش، حمایت ساختاری چون حمایت تأمین دارد و حمایت اطلاعاتی چون آموزش و مشاوره می‌تواند وجود داشته باشد و در بهبودی بیمار نقش مهمی را ایفاء کند [۶۳]. از طرفی ویژگی‌های شخصیتی در تبعیت از درمان تأثیر دارد. وظیفه‌شناسی با مقابله فعال و مشکل‌محور ارتباط دارد. افرادی که بعد وظیفه‌شناسی شخصیت در آنان پرنگ است، از راهبردهای برنامه‌ریزی چون راهبرد آگاهانه و مقابله کردن فعال برای حذف مشکلات به‌وجود آمده، استفاده می‌کنند. آن‌ها تمایلی به حذف هدف‌هایشان ندارند و بیشتر به حذف مشکلات فکر

20. discontinuation of behavioral conflict  
21. discontinuation of mental involvement

مورد آزمون قرار داد.

در پایان می‌توان گفت که تأکید بر مطالعه چندمتغیری و سازه‌های بنیادین روانی برای کمک به زندگی بهینه بیماران مبتلا به سرطان از نقاط قوت پژوهش حاضر محسوب می‌شود. با این حال استفاده صرف از پرسشنامه از محدودیت‌های پژوهش است که احتیاط لازم را در تعمیم تفسیر یافته‌ها می‌طلبد. پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی از روش‌هایی چون مصاحبه نیز برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شود. با توجه به پیشرفت‌های پزشکی در حیطه مسائل جسمی این بیماران و طولانی‌تر شدن عمر آنان و عدم توجه کافی به مسائل روانی آنان در آن سوی طیف، پیشنهاد می‌شود بخش روان‌درمانی نیز به عنوان یک جز لاینک در پروسه درمان بیماران مبتلا به سرطان قرار گیرد.

## منابع

- demoralization with mental disorders and suicidal ideation in patients with cancer. *Cancer*. 2017; 123(17): 3394-401. <https://doi.org/10.1002/cncr.30749>
- 7- Ng CG, Mohamed S, Kaur K, Sulaiman AH, Zainal NZ, Taib NA, et al. Perceived distress and its association with depression and anxiety in breast cancer patients. *PLoS One*. 2017; 12(3): e0172975. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172975>
- 8- The Global Cancer Observatory. Islamic Republic of Iran. 2021; International Agency for Research on Cancer: WHO; Routledge. <https://doi.org/https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/>
- 9- Drageset S, Austrheim G, Ellingsen S. Quality of life of women living with metastatic breast cancer and receiving palliative care: A systematic review. *Health Care for Women International*. 2021; 42(7-9): 1044-65. <https://doi.org/10.1080/07399332.2021.1876063>
- 10- Ribi K, Luo W, Colleoni M, Karlsson P, Chirgwin J, Aebi S, et al. Abstract P5-18-01, Extended continuous vs intermittent adjuvant letrozole in postmenopausal women with lymph node-positive, early breast cancer (IBCSG 37-05/BIG 1-07 SOLE), Impact on patient-reported symptoms and quality of life. *Cancer Research*. 2018; 78(4): P5-18-01-P5-18-01. <https://doi.org/10.1158/1538-7445.SABCS17-P5-18-01>
- 11- Stagl JM, Antoni MH, Lechner SC, Bouchard LC, Blomberg BB, Glück S, et al. Randomized controlled trial of cognitive behavioral stress management in breast cancer: A brief report of effects on 5-year depressive symptoms. *Health Psychology: Official Journal of the Division of Health Psychology, American Psychological Association*. 2015; 34(2): 176-80. <https://doi.org/10.1037/he0000125>
- 12- Isfahani P, Arefy M, Shamsaii M. Prevalence of severe depression in Iranian women with breast cancer: A meta-analysis. *Depress Res Treat*. 2020; 2020: 5871402. <https://doi.org/10.1155/2020/5871402>
- 13- Roshandel G, Ferlay J, Ghanbari-Motlagh A, et al. Cancer in Iran 2008 to 2025: Recent incidence trends and short-term predictions of the future burden. *Int. J. Cancer*. 2021; 149: 594-605. <https://doi.org/10.1002/ijc.33574>
- 14- Prell, T. Adherence to medication in neurogeriatric patients: an observational cross-sectional study. *BMC Public Health*. 2019; 19, 1012. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7353-5>

- Encyclopedia of Personality and Individual Differences. 2020; 1(2): 3600-7. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-24612-3\\_2276](https://doi.org/10.1007/978-3-319-24612-3_2276)
- 24- Greco A, Steca P, Pozzi R, Monzani D, D'Addario M, Villani A, et al. Predicting depression from illness severity in cardiovascular disease patients: Self-efficacy beliefs, illness perception, and perceived social support as mediators. *Int J Behav Med.* 2014; 21(2): 221-9. <https://doi.org/10.1007/s12529-013-9290-5>
- 25- World Health Organization. Rapid communication: Key changes to treatment of multidrug -and rifampicin-resistant tuberculosis (MDR/RR-TB); 2018. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275383/>
- 26- World Health Organization. Global action plan on physical activity 2018-2030: More active people for a healthier world; 2019. 4.
- 27- Ivanovska V, Hek K, Mantel Teeuwisse AK, Leufkens HGM, Nielen MMJ, Van Dijk L. Antibiotic prescribing for children in primary care and adherence to treatment guidelines. *J Antimicrob Chemother.* 2016; 71(6): 1707-14. <https://doi.org/10.1093/jac/dkw0305>
- 28- Hedayati A, Mani A, Hamidizadeh N, Chohedri E, Moradi Khalaj H, Moshfeghinia R, et al. Association of personality traits with treatment adherence in vitiligo. *J Iran Med Counc.* 2023; 6(3): 535-41. <https://doi.org/10.18502/jimc.v6i3.12858>
- 29- Kheirabadi G, Akashe Z, Maracy MR, Bagherian-Sararoudi R. The relationship between personality traits and adherence among patients with hypertension. *International Archives of Health Sciences.* 2020; 7(1): 43-52. [https://doi.org/10.4103/iahs.iahs\\_61\\_19](https://doi.org/10.4103/iahs.iahs_61_19)
- 30- Nguyen TA, Pham MT, Nguyen TL, Nguyen VN, Pham DC, Nguyen BH, et al. Video directly observed therapy to support adherence with treatment for tuberculosis in Vietnam: A prospective cohort study. *Int J Infect Dis.* 2017; 65: 85-9. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2017.09.029>
- 31- Costedoat-Chalumeau N, Houssiau F, Izmirly P, Le Guern V, Navarra S, Jolly M, et al. A prospective international study on adherence to treatment in 305 patients with flaring sle: Assessment by drug levels and self-administered questionnaires. *Clin Pharmacol Ther.* 2018; 103(6): 1074-82. <https://doi.org/10.1002/cpt.885>
- 32- Demirci K, Demirci S, Taşkiran E, Kutluhan S. The effects of temperament and character traits on
- 15- Carvalho AS, Santos P. Medication Adherence In Patients With Arterial Hypertension: The Relationship With Healthcare Systems' Organizational Factors. *Patient Prefer Adherence.* 2019 Oct; 17;13:1761-1774. doi: [10.2147/PPA.S216091](https://doi.org/10.2147/PPA.S216091).
- 16- Walburn J, Sainsbury K, Foster L, Weinman J, Morgan M, Norton S, Canfield M, Chadwick, P., Sarkany R., & Araujo-Soares, V. Why? What? How? Using an intervention mapping approach to develop a personalised intervention to improve adherence to photoprotection in patients with Xeroderma Pigmentosum. *Health Psychology and Behavioral Medicine.* 2020; 8(1):475–500. [10.1080/21642850.2020.1819287](https://doi.org/10.1080/21642850.2020.1819287)
- 17- Nonogaki A, Heang H, Yi S, van Pelt M, Yamashina H, Taniguchi C, Nishida T, Sakakibara H. Factors associated with medication adherence among people with diabetes mellitus in poor urban areas of Cambodia: A cross-sectional study. *PLoS One.* 2019;14(11):e0225000. doi: [10.1371/journal.pone.0225000](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225000).
- 18- Ko JH, Joo EJ, Park SJ, Baek JY, Kim WD, Jee J. Neutralizing antibody production in asymptomatic and mild COVID-19 patients, in comparison with pneumonic COVID-19 patients. *J Clin. Med.* 2020; 9:2268. doi: [10.3390/jcm9072268](https://doi.org/10.3390/jcm9072268)
- 19- Yangöz ST, Özer Z, & Boz İ. Comparison of the effect of educational and self-management interventions on adherence to treatment in hemodialysis patients: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Int J Clin Pract.* 2021; 75(5):e13842. <https://doi.org/10.1111/ijcp.13842>
- 20- Noble LM. Doctor-patient communication and adherence to treatment. In adherence to treatment in medical conditions (pp. 51-82). CRC Press; 2020. <https://doi.org/10.1201/9781003072348-5>
- 21- Rea F, Savaré L, Franchi M, Corrao G, Mancia G. Adherence to treatment by initial antihypertensive mono and combination therapies. *Am J Hypertens.* 2021; 34(10):1083-91. <https://doi.org/10.1093/ajh/hpab083>
- 22- Turan B, Hatcher AM, Weiser SD, Johnson MO, Rice WS, Turan JM. Framing mechanisms linking HIV-related stigma, adherence to treatment, and health outcomes. *Am J Public Health.* 2017; 107(6): 863-9. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2017.303744> 2
- 23- Kozak AT, Hawkins MA, Dibble TL. Personality and dispositional factors in relation to chronic disease management and adherence to treatment.

- communication outcomes across communication disorders: A systematic review. *Int J Lang Commun Disord.* 2018; 53(6): 1059-77. <https://doi.org/10.1111/1460-6984.12417>
- 42- Kelly EL, Fenwick KM, Brekke JS, Novaco RW. Sources of social support after patient assault as related to staff well-being. *J Interpers Violence.* 2017; 31(1): 886260517738779. <https://doi.org/10.1177/0886260517738779>
- ۴۳- توجهی، مطهره و تمایلی‌فر، محمدرضا. رابطه راهبردهای مقابله‌ای و حمایت اجتماعی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان در پاندمی کووید-۱۹: نقش واسطه‌ای تاب‌آوری تحصیلی. *روان‌شناسی بالینی و شخصیت.* ۱۴۰۱، ۲۰(۲)، ۱۶۳-۱۴۰. <https://doi.org/10.22070/cpac.2023.16237.1228>
- 44- Nambisan P, Gustafson DH, Hawkins R, Pingree S. Social support and responsiveness in online patient communities: Impact on service quality perceptions. *Health Expect.* 2016; 19(1): 87-97. <https://doi.org/10.1111/hex.12332>
- 45- Attaran Khorasani A, Aldaghi M, Darbanbashi Khamesi N, Maleki M, Jahani Z, Razavi R. Structural pattern of personality traits in cancer patients on treatment adherence and self-efficacy mediated by social support. *Iranian Journal of Health Psychology.* 2023; 6(1): 27-54. <https://doi.org/10.30473/ijohp.2023.64171.1253>
- 46- Kadambi S, Soto-Perez-De-Celis E, Garg T, Loh K, Krok-Schoen JI, et al. Social support for older adults with cancer: Young international society of geriatric oncology review paper. *J Geriatr Oncol.* 2020; 11(2): 217-24. <https://doi.org/10.1016/j.jgo.2019.09.005>
- 47- Kim B, Kim J. Influence of uncertainty, depression, and social support on self-care compliance in hemodialysis patients. *Ther Clin Risk Manag.* 2019; 15: 1243. <https://doi.org/10.2147/TCRM.S218934>
- 48- Nguyen PT, Hernández A, Costet N, Patural H, Pichot V, Carrault G, et al. Improving methodology in heart rate variability analysis for the premature infants: Impact of the time length. *Plos one.* 2019; 14(8): e0220692. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220692>
- 49- Razavi R, Yaghubi H, Ganji K, Khajevand Khoshli A. Modeling the relationships between cancer self-efficacy and role treatment adherence in women with breast cancer: The mediating role of social support. *Nursing and Midwifery Journal.* 2021; 19(2): 158-68. <http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4277-en.html>
- 50- Beshldeh K. (2014). Research methods and statistical analysis of research examples with SPSS and AMOS. Ahvaz: Shahid Chamran perceived social support and quality of life in patients with epilepsy. *Epilepsy Behav.* 2017; 74: 22-6. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2017.05.039>
- 33- Akçay BD, Güç VO, Özer S. Temperament and character traits in patients with anorectal disorder. *Journal of Surgery and Medicine.* 2018; 2(1): 17-22. <https://doi.org/10.28982/josam.370190>
- 34- Aker D, Kose S, Solmaz M, Bal Z, Akin E. Temperament and character dimensions of personality in patients with chronic pain disorders. *Journal of Mood Disorders.* 2017; 7(1): 11-23. <https://doi.org/10.5455/jmood.20170214015231>
- 35- Giulietti MV, Vespa A, Ottaviani M, Berardi R, Baleria G, Arnaldi G, Gattafoni P, Fabbietti P, Rosa MD, Spatuzzi R. Personality (at Intrapsychic and Interpersonal Level) Associated with Quality of Life in Patients with Cancer (Lung and Colon). *Cancer control. Journal of the Moffitt Cancer Center.* 2019; 26(1): 1073274819880560. <https://doi.org/10.1177/1073274819880560>
- 36- Tamura S, Suzuki K, Ito Y, Fukawa, A. Factors related to the resilience and mental health of adult cancer patients: A systematic review. *Supportive Care in Cancer.* 2021; 29(7): 3471-86. <https://doi.org/10.1007/s00520-020-05943-7>
- 37- Nielsen MB, Christensen JO, Finne LB, Knardahl, S. Workplace bullying, mental distress, and sickness absence: The protective role of social support. *International Archives of Occupational and Environmental Health.* 2020; 93(1): 43-53. <https://doi.org/10.1007/s00420-019-01463-y>
- ۳۸- رستمی، لیدا و گودرزی، محمود. مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و نحوه نگرش به انتخاب همسر در دانشجویان متاهل دارای رابطه و فاقد رابطه قبل از ازدواج. *روان‌شناسی بالینی و شخصیت.* ۱۴۰۱، ۲۰(۱)، ۴۴-۳۱.
- <https://doi.org/10.22070/cpac.2022.15104.1141>
- ۳۹- ابراهیمی، لقمان و الماسی، مجید. نقش ویژگی‌های شخصیتی، ناگویی هیجانی و اجتناب‌شناختی در پیش‌بینی عاطفه مثبت و منفی. *روان‌شناسی بالینی و شخصیت.* ۱۴۰۲، ۲۱(۱)، ۵۶-۴۳.
- <https://doi.org/10.22070/cpac.2023.15081.1137>
- 40- İzci F, Erdogan Zİ, İlgün AS, Çelebi E, Alço G, Kocaman N, et al. Impact of personality traits, anxiety, depression and hopelessness levels on quality of life in the patients with breast cancer. *European Journal of Breast Health.* 2018; 14(2): 105-11. <https://doi.org/10.5152/ejbh.2018.3724>
- 41- Eadie T, Kapsner-Smith M, Bolt S, Sauder C, Yorkston K, Baylor C. Relationship between perceived social support and patient -reported

- adolescents. *American journal of community psychology*, 28(3), 391-400.
- 61- Dhalem NW, Zimet GD, Walker, RR. The multidimensional scale of perceived social support: A confirmation study. *Journal of Clinical Psychology*. 1991; 47(6): 756-61. [https://doi.org/10.1002/1097-4679\(199111\)47:6<756::AID-JCLP2270470605>3.0.CO;2-L](https://doi.org/10.1002/1097-4679(199111)47:6<756::AID-JCLP2270470605>3.0.CO;2-L)
- 62- بشارت، محمدعلی. (۱۳۸۵). پایابی و اعتبار مقیاس سلامت روانی (MHI). *دانش و رفتار*. ۱۶: ۱۱-۱۶.
- <https://ensani.ir/fa/article/journal-number/13521/>
- 63- Berglund E, Lytsy P, Westerling R. Living environment, social support, and informal caregiving are associated with healthcare seeking behaviour and adherence to medication treatment: A cross-sectional population study. *Health Soc Care Community*. 2019; 27(5): 1260-70. <https://doi.org/10.1111/hsc.12758>
- 64- Berner C, Erlacher L, Fenzl KH, Dorner TE. Medication adherence and coping strategies in patients with rheumatoid arthritis: A cross-sectional study. *Int J Rheumatol*. 2019; 4709645. <https://doi.org/10.1155/2019/4709645>
- 65- Ceranic J, Kisic Tepavcevic D, Petronijevic M, Milic M, Ceranic M, Rancic N, Ristic G. Assessment and prediction of adherence to methotrexate using three self-report questionnaires in patients with rheumatoid arthritis. *Medicina (Kaunas)*. 2023; 59(8): 1446. <https://doi.org/10.3390/medicina59081446>
- University of Ahvaz Publications. (Persian) <https://scholar.google.com/scholar>
- ۵۱- سیدفاطمی، نعیمه؛ رفیعی، فروغ؛ حاجیزاده، ابراهیم؛ مدانلو، مهناز. طراحی و روان‌سنجی پرسشنامه تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به بیماری مزمن: یک مطالعه ترکیبی. *کوشه*. ۱۳۹۷؛ ۲۰(۲): ۱۹۱-۱۷۹. <http://koomehjournal.semums.ac.ir/>
- ۵۲- رامک، ناهید؛ قاسم‌نژاد، کیانا؛ قاسم‌پور، الهه؛ صادق‌خانی، زینب؛ سام‌خانیان، اسحاق؛ بی‌باک، فرشید؛ همکاران. بررسی تأثیر روان‌درمانی تحلیلی کارکردی بر تبعیت درمانی و رفتارهای خودمراقبتی در زنان مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد. *نشریه پرستاری قلب و عروق*. ۱۴۰. ۲۷-۲۰: ۱۷۰-۱۶۱. <http://journal.icns.org.ir/article-1-700-fa.html>
- 53- Costa PT, McCrae RR. The five-factor model of personality and its relevance to personality disorders. *Journal of Personality Disorders*. 1992; (4): 343-59. <https://doi.org/10.1521/pedi.1992.6.4.343>
- 54- Muris P, Meesters C, Diederen R. Psychometric properties of the big five questionnaires for children (BFQ-C) in a dutch sample of young adolescents. *Pers Individ Dif*. 2005; 38(8): 1757-69. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.11.018>
- 55- Nikoogoftar M, Jazayeri F. Five-factor traits of personality are a predictor of mothers' aggression. *Knowledge & Research in Applied Psychology*. 2019; 20(2): 58-68. <https://doi.org/10.30486/JSRP.2019.665275>
- ۵۶- احمدی، عزت‌الله؛ بافنده، حسن؛ و محکی، محمد. نقش صفات شخصیت در پیش‌بینی سندروم روده تحریک‌پذیر با واسطه‌گری حساسیت اضطرابی. *روان‌شناسی بالینی و شخصیت*. ۱۴۰۲؛ ۲۱(۲): ۸۶-۷۳.
- <https://doi.org/10.22070/cpac.2023.14645.1104>
- 57- Zimet GD, Dahlem NW, Zimet SG, Farley GK. The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. *Journal of Personality Assessment*. 1988; 52: 30-41. [https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5201\\_2](https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5201_2)
- 58- Stanley MA, Beck JG, Zebb BJ. Psychometric properties of the MSPSS in older adults. *Aging and Mental Health*. 1998; 2: 186-93. <https://doi.org/10.1080/13607869856669>
- 59- Bruwer B, Emsley R, Kidd M, Lochner C, Seedat S. Psychometric properties of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support in youth. *Comprehensive Psychiatry*. 2008; 49: 195-201. <https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2007.09.002>
- 60- Canty-Mitchell, J., & Zimet, G. D. (2000). Psychometric properties of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support in urban